



## 正 誤 表

「一般社団法人日本静脈経腸栄養学会 静脈経腸栄養テキストブック（第1刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正
20	13行目	アーケイドを形成する腓頭十二指腸動脈（前上腓十二指腸動脈：AIPDA、後上腓十二指腸動脈：PSPDA、後下腓十二指腸動脈：PIPDA）	アーケイドを形成する腓頭十二指腸動脈（前上腓十二指腸動脈：ASPDA、前下腓十二指腸動脈：AIPDA、後上腓十二指腸動脈：PSPDA、後下腓十二指腸動脈：PIPDA）

23	図 1	図差し替え 	正図 
24	下から 3 行目	上向結腸	上行結腸
135	表 3 GNRI (Geriatric Nutritional Risk Index)	$GNRI = 1.489 \times \text{血清 Alb (g/L)} + 41.7 \times \text{現体重/理想体重}$	$GNRI = 14.89 \times \text{血清 Alb (g/L)} + 41.7 \times \text{現体重/理想体重}$
417	下から 1 行目	発汗不感蒸泄量は 2 ~ 3 mL/kg/時、15mL × 体重 (kg) + 200mL (体重 - 36.8) で計算する。	発汗不感蒸泄量は 0.4 ~ 0.5 mL/kg/時、15mL × 体重 (kg) + 200mL (体温 - 36.8) で計算する。

588	<p>表 4 在宅経腸栄養法に関する保険請求</p>	<p>表 4 在宅経腸栄養法に関する保険請求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 (成分栄養剤または消化態栄養剤) 2,500 点 栄養管セット加算 2,000 点 注入ポンプ加算 1,000 点</li> <li>2. 在宅寝たきり患者処置指導管理料 (半消化態栄養剤) 1,050 点</li> </ol>	<p>表 4 在宅経腸栄養法に関する保険請求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 (成分栄養剤または消化態栄養剤) 2,500 点 在宅成分栄養経管栄養法用 栄養管セット加算 2,000 点 注入ポンプ加算 1,250 点</li> <li>2. 在宅小児経管栄養法指導管理料 1,050 点 在宅成分栄養経管栄養法用 栄養管セット加算 2,000 点 注入ポンプ加算 1,250 点</li> <li>3. 在宅寝たきり患者処置指導管理料 (半消化態栄養剤) 1,050 点</li> </ol>
-----	----------------------------	--	--

2018年3月1日  
株式会社南江堂